

【贮 藏】 本品未开封时可在室温保存。本品在使用前须振摇混合均匀，一旦开封请立即饮用。开封后可在冰箱保存24小时。在准备和使用过程中须防止细菌污染。未开封的产品请在产品有效期内使用。 【包 装】包装材料为EZO罐和RTH塑料瓶；包装规格：250ml/罐，500ml/瓶。 【有 效 期】15个月。 【进口药品注册标准】JX20080276(250ml)；JX20201024(500ml) 【进口药品注册证号】H20160134 (250ml)；H20160135(500ml) 【上市许可持有人】 企业名称：ABBOTT LABORATORIES B.V. 地 址：Rieteweg 21, 8041AJ Zwolle, The Netherlands 荷兰 【生产企业】 企业名称： ABBOTT LABORATORIES B.V. 生产地址： Rieteweg 21, 8041AJ Zwolle, The Netherlands 荷兰 【国内联系方式】 名 称：雅培贸易（上海）有限公司 地 址：上海市南京西路388号仙乐斯广场28楼 邮政编码：200003 电话号码：021-23204388 传真号码：021-63346300 标签号: 130-072-004 List No.: M525 ©2021Abbott 5	核准日期: 2006 年 10 月 27 日 修订日期: 2007 年 07 月 11 日 修订日期: 2009 年 09 月 30 日 修订日期: 2011 年 03 月 23 日 修订日期: 2016 年 01 月 29 日 修订日期: 2019 年 01 月 17 日 修订日期: 2020 年 10 月 14 日 修订日期: 2021 年 01 月 08 日 肠内营养混悬液（TPF-D）说明书 请仔细阅读说明书并在医师指导下使用 【药品名称】 通用名称: 肠内营养混悬液（TPF-D） 商品名称: GLUCERNA®（伊力佳®） 英文名称: Enteral Nutritional Suspension (TPF-D) 汉语拼音: Changnei Yingyang Hunxuanye (TPF-D) 【成 份】 本品为复方制剂，其组份为：蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质。每100ml本品含有以下营养素： <table><tr><td>能量</td><td>101kcal</td><td>烟酸</td><td>1.7 mg NE</td></tr><tr><td>蛋白质</td><td>4.18 g</td><td>泛酸</td><td>0.75 mg</td></tr><tr><td>脂肪</td><td>5.44 g</td><td>生物素</td><td>4.0 µg</td></tr><tr><td>碳水化合物</td><td>8.14 g</td><td>胆碱</td><td>42 mg</td></tr><tr><td>总膳食纤维</td><td>1.44 g</td><td>矿物质</td><td></td></tr><tr><td>水</td><td>84.9 g</td><td>钠</td><td>93 mg</td></tr><tr><td>肉碱</td><td>7.8 mg</td><td>钾</td><td>130 mg</td></tr><tr><td>牛磺酸</td><td>11 mg</td><td>氯</td><td>125 mg</td></tr><tr><td>肌醇</td><td>84 mg</td><td>钙</td><td>70 mg</td></tr><tr><td>维生素</td><td></td><td>磷</td><td>65 mg</td></tr><tr><td>维生素 A*</td><td>546 IU</td><td>镁</td><td>20 mg</td></tr><tr><td>维生素 D₃</td><td>28 IU</td><td>铁</td><td>1.3 mg</td></tr><tr><td>维生素 E</td><td>3.2 IU</td><td>锌</td><td>1.2 mg</td></tr><tr><td>维生素 K₁</td><td>5.6 µg</td><td>锰</td><td>0.35 mg</td></tr><tr><td>维生素 C</td><td>11 mg</td><td>铜</td><td>0.14 mg</td></tr><tr><td>叶酸</td><td>42 µg</td><td>碘</td><td>11 µg</td></tr><tr><td>维生素 B₁</td><td>0.16 mg</td><td>硒</td><td>4.9 µg</td></tr><tr><td>维生素 B₂</td><td>0.18 mg</td><td>铬</td><td>7.0 µg</td></tr><tr><td>维生素 B₆</td><td>0.21 mg</td><td>钼</td><td>10 µg</td></tr><tr><td>维生素 B₁₂</td><td>0.30 µg</td><td></td><td></td></tr></table> * 每100ml中所含β胡萝卜素相当于维生素A 280 IU。 【性 状】 本品为浅棕黄色不透明混悬液，具牛奶香草样气味。 1	能量	101kcal	烟酸	1.7 mg NE	蛋白质	4.18 g	泛酸	0.75 mg	脂肪	5.44 g	生物素	4.0 µg	碳水化合物	8.14 g	胆碱	42 mg	总膳食纤维	1.44 g	矿物质		水	84.9 g	钠	93 mg	肉碱	7.8 mg	钾	130 mg	牛磺酸	11 mg	氯	125 mg	肌醇	84 mg	钙	70 mg	维生素		磷	65 mg	维生素 A*	546 IU	镁	20 mg	维生素 D ₃	28 IU	铁	1.3 mg	维生素 E	3.2 IU	锌	1.2 mg	维生素 K ₁	5.6 µg	锰	0.35 mg	维生素 C	11 mg	铜	0.14 mg	叶酸	42 µg	碘	11 µg	维生素 B ₁	0.16 mg	硒	4.9 µg	维生素 B ₂	0.18 mg	铬	7.0 µg	维生素 B ₆	0.21 mg	钼	10 µg	维生素 B ₁₂	0.30 µg		
能量	101kcal	烟酸	1.7 mg NE																																																																														
蛋白质	4.18 g	泛酸	0.75 mg																																																																														
脂肪	5.44 g	生物素	4.0 µg																																																																														
碳水化合物	8.14 g	胆碱	42 mg																																																																														
总膳食纤维	1.44 g	矿物质																																																																															
水	84.9 g	钠	93 mg																																																																														
肉碱	7.8 mg	钾	130 mg																																																																														
牛磺酸	11 mg	氯	125 mg																																																																														
肌醇	84 mg	钙	70 mg																																																																														
维生素		磷	65 mg																																																																														
维生素 A*	546 IU	镁	20 mg																																																																														
维生素 D ₃	28 IU	铁	1.3 mg																																																																														
维生素 E	3.2 IU	锌	1.2 mg																																																																														
维生素 K ₁	5.6 µg	锰	0.35 mg																																																																														
维生素 C	11 mg	铜	0.14 mg																																																																														
叶酸	42 µg	碘	11 µg																																																																														
维生素 B ₁	0.16 mg	硒	4.9 µg																																																																														
维生素 B ₂	0.18 mg	铬	7.0 µg																																																																														
维生素 B ₆	0.21 mg	钼	10 µg																																																																														
维生素 B ₁₂	0.30 µg																																																																																

【适 应 症】 本品是含有膳食纤维的特殊全营养液体制剂，主要适用于糖尿病患者。 【规 格】250ml(1.01kcal/ml)，500ml(1.01kcal/ml) 【用法用量】 本品可提供全面的、均衡的营养，并可长期作为营养支持的唯一来源。1升本品可提供1010kcal的热量。本品可以管饲也可以口服。 管饲注意事项 要遵医嘱进行。 管饲的方法和输入进度是基于以下几点考虑的： ● 对每个患者热量和营养素的需求的评估； ● 管饲的位置； ● 患者的体格条件； ● 应用抗高血糖药物和/或胰岛素的剂量和用药方法及时间 选择合适的管饲方法可以帮助确保患者耐受该配方，满足患者对热量和营养素的需求，以控制好血糖。不论使用何种管饲方法，胰岛素和/或口服降血糖药物的剂量和使用方法须随管饲方法的改变而调整。 应该紧密地监视管饲的高血糖患者，特别是血糖的控制，其液体和电解质的状态。管饲的输入和/或药物的用法用量要根据需要随之调整。 管饲的方法 间断管饲 这种方法是通过缓慢的重力作用滴下或肠内管饲泵来传输营养素。一次处方的量（通常250到500mL）通常输入的时间为20到40分，一天5到8次。采用重力法管饲时，应使用10F或更大的管饲设备。选用管饲泵要优于重力法管饲，因为可能会有胃肠道不耐受的症状的发生，特别是在管饲速度快或管饲容量大时。间断管饲或许有更好的优越性，因为它更像正常饮食的形式。 2	持续管饲 这种方法是通过长期的连续滴入的方式来传输营养素，一般是持续16到24小时。通常的，一个肠内管饲泵维持一个固定的输入速度。 开始管饲时，管饲速率和管饲量取决于患者的身体状况和耐受性。如果没有不良反应发生，管饲速率和数量可逐渐增加直至摄入所需能量。管饲容量、速率、强度在管饲过程中须根据患者的营养需要和耐受性进行相应调整。一般建议在第一个8小时的起始速度为25-30mL/hr,可以在随后的8小时增加速度，直到在24-48小时内达到目的。 持续管饲是糖尿病患者较好的选择，因为持续超过24小时给予营养素可能会改善血糖控制并降低胰岛素需要量。 对应用管饲进行营养支持的患者的观察 血糖 许多糖尿病患者，特别是应用胰岛素或降血糖药物的患者要定期的检测血糖水平。也要求对通过管饲进行肠内营养支持的患者检测，尽管他们不能自己测。开始管饲前，和管饲期间要定期确认血糖水平。 液体和电解质的状态 液体失衡会导致代谢紊乱。通常的，液体的摄入与排出相当，包括从肺部和皮肤的流失（通常每天为800mL）。评估身体水分的状态对糖耐量异常的患者来说是很重要的。很明显，脱水与糖尿病病情恶化或失控有关。一些管饲患者，由于其自身的条件，限制液体的摄入是很有必要的。因为这些患者对水的要求是不断变化的，同一个患者随着时间的变化定时评估其液体和电解质状态是需要的。 口服 热量需要依个体需要不同而异，因此需按医嘱使用。 3	【不良反应】 使用本品可能引起胃肠道不耐受，包括恶心、呕吐、腹痛、腹胀、腹泻、便秘等。 【禁 忌】 本品和其他医用营养品一样，不适用于不推荐口服或肠内营养的情况。这些情况包括肠梗阻、短肠综合征及药物治疗难于缓解的腹泻，但不仅限于此。本品同样不适用于已知对本品任一成分过敏的患者，不适用于半乳糖血症患者和对牛奶或大豆蛋白质敏感的患者。 【注意事项】 ● 本品不能用于肠外和静脉注射。 ● 本品应该在医师监督下管饲。 ● 本品不能用于儿童，除非医师或保健专家推荐使用。 ● 不恰当的管饲方式可引起疾病，在准备和使用过程中应注意避免细菌污染。使用前应洗手。 ● 在药物治疗前后用饮用水冲洗管饲管道可减少药物-营养物质不相容和管饲管堵塞的可能性。切忌用已被污染的水冲洗管道。 【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。 【儿童用药】 本品不能用于儿童。除非医师或保健专家推荐使用。 【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。 【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。 【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。 【药理毒理】未进行该项实验且无可靠参考文献。 【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。 4
---	---	---