93 mm　　95 mm　　97 mm

145 mm

【贮　藏】

本品未开封时可在室温保存。本品在使用前须振摇混合均匀，一旦开封请即饮用。开封后可在冰箱保存24小时。在准备和使用过程中须防止细菌污染。未开封的产品请在产品有效期前使用。

【包　装】包装材料为RTH塑料瓶；包装规格：500ml/瓶。

【有 效 期】15个月。

【执行标准】JX20201024

【批准文号】国药准字HJ20160135

【上市许可持有人】

企业名称：ABBOTT LABORATORIES B.V.

地　　址：Rieteweg 21, 8041AJ Zwolle, The Netherlands荷兰

【生产企业】

企业名称：ABBOTT LABORATORIES B.V.

生产地址：Rieteweg 21, 8041AJ Zwolle, The Netherlands荷兰

【境内联系人】

名　　称：雅培贸易（上海）有限公司

注册地址：上海市自由贸易试验区美盛路56号4号楼109部位

邮政编码：200131

电话号码：400-920-2660

传真号码：021-63346300

【境内责任人】

名　　称：雅培贸易（上海）有限公司

地　　址：上海市自由贸易试验区美盛路56号4号楼109部位

联系方式：400-920-2660

标签号: 130-072-006
List No.: M525
©2025 Abbott

核准日期：2006年10月27日
修订日期：2007年07月11日
修订日期：2009年09月30日
修订日期：2011年03月23日
修订日期：2016年01月29日
修订日期：2019年01月17日
修订日期：2020年10月14日
修订日期：2021年01月08日
修订日期：2023年12月26日
修订日期：2025年03月12日

肠内营养混悬液（TPF-D）说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：肠内营养混悬液（TPF-D）

商品名称：GLUCERNA®（伊力佳®）

英文名称：Enteral Nutritional Suspension (TPF-D)

汉语拼音：Changnei Yingyang Hunxuanye (TPF-D)

【成　份】

本品为复方制剂，其组份为：蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质。每100ml本品含有以下营养素：

能量	101kcal	烟酸	1.7 mg NE
蛋白质	4.18 g	泛酸	0.75 mg
脂肪	5.44 g	生物素	4.0 μg
碳水化合物	8.14 g	胆碱	42 mg
总膳食纤维	1.44 g	**矿物质**	
水	84.9 g	钠	93 mg
肉碱	7.8 mg	钾	130 mg
牛磺酸	11 mg	氯	125 mg
肌醇	84 mg	钙	70 mg
维生素		磷	65 mg
维生素 A*	546 IU	镁	20 mg
维生素 D_3	28 IU	铁	1.3 mg
维生素 E	3.2 IU	锌	1.2 mg
维生素 K_1	5.6 μg	锰	0.35 mg
维生素 C	11 mg	铜	0.14 mg
叶酸	42 μg	碘	11 μg
维生素 B_1	0.16 mg	硒	4.9 μg
维生素 B_2	0.18 mg	铬	7.0 μg
维生素 B_6	0.21 mg	钼	10 μg
维生素 B_{12}	0.30 μg		

* 每100ml中所含β-胡萝卜素相当于维生素A 280 IU。

【性　状】

本品为浅棕黄色不透明混悬液，具牛奶香草样气味。

97 mm　　95 mm　　93 mm

145 mm

【适 应 症】

本品是含有膳食纤维的特殊全营养液体制剂，主要适用于糖尿病患者。

【规　　格】500ml(1.01kcal/ml)

【用法用量】

本品可提供全面的、均衡的营养，并可长期作为营养支持的唯一来源。1升本品可提供1010kcal的热量。本品可以管饲也可以口服。

管饲注意事项

要遵医嘱进行。

管饲的方法和输入进度是基于以下几点考虑的：

- 对每个患者热量和营养素的需求的评估；
- 管饲的位置；
- 患者的体格条件；
- 应用抗高血糖药物和/或胰岛素的剂量和用药方法及时间

选择合适的管饲方法可以帮助确保患者耐受该配方，满足患者对热量和营养素的需求，以控制好血糖。不论使用何种管饲方法，胰岛素和/或口服降血糖药物的剂量和使用方法须随管饲方法的改变而调整。

应该紧密地监视管饲的高血糖患者，特别是血糖的控制，其液体和电解质的状态。管饲的输入和/或药物的用法用量要根据需要随之调整。

管饲的方法

间断管饲

这种方法是通过缓慢的重力作用滴下或肠内管饲泵来传输营养素。一次处方的量（通常250到500mL）通常输入的时间为20到40分，一天5到8次。采用重力法管饲时，应使用10F或更大的管饲设备。选用管饲泵要优于重力法管饲，因为可能会有胃肠道不耐受的症状的发生，特别是在管饲速度快或管饲容量大时。间断管饲或许有更好的优越性，因为它更像正常饮食的形式。

持续管饲

这种方法是通过长期的连续滴入的方式来传输营养素，一般是持续16到24小时。通常的，一个肠内管饲泵维持一个固定的输入速度。

开始管饲时，管饲速率和管饲量取决于患者的身体状况和耐受性。如果没有不良反应发生，管饲速率和数量可逐渐增加直至摄入所需能量。管饲容量、速率、强度在管饲过程中须根据患者的营养需要和耐受性进行相应调整。一般建议在第一个8小时的起始速度为25-30mL/hr,可以在随后的8小时增加速度，直到在24-48小时内达到目的。

持续管饲是糖尿病患者较好的选择，因为持续超过24小时给予营养素可能会改善血糖控制并降低胰岛素需要量。

对应用管饲进行营养支持的患者的观察

血糖

许多糖尿病患者，特别是应用胰岛素或降血糖药物的患者要定期的检测血糖水平。也要求对通过管饲进行肠内营养支持的患者检测，尽管他们不能自己测。开始管饲前，和管饲期间要定期确认血糖水平。

液体和电解质的状态

液体失衡会导致代谢紊乱。通常的，液体的摄入与排出相当，包括从肺部和皮肤的流失（通常每天为800mL）。评估身体水分的状态对糖耐量异常的患者来说是很重要的。很明显，脱水与糖尿病病情恶化或失控有关。一些管饲患者，由于其自身的条件，限制液体的摄入是很有必要的。因为这些患者对水的要求是不断变化的，同一个患者随着时间的变化定时评估其液体和电解质状态是需要的。

口服

热量需要依个体需要不同而异，因此需按医嘱使用。

【不良反应】

使用本品可能引起胃肠道不耐受，包括恶心、呕吐、腹痛、腹胀、腹泻、便秘等。

【禁　忌】

本品和其他医用营养品一样，不适用于不推荐口服或肠内营养的情况。这些情况包括肠梗阻、短肠综合征及药物治疗难于缓解的腹泻，但不仅限于此。本品同样不适用于已知对本品任一成分过敏的患者，不适用于半乳糖血症患者和对牛奶或大豆蛋白质敏感的患者。

【注意事项】

- 本品不能用于肠外和静脉注射。
- 本品应该在医师监督下管饲。
- 本品不能用于儿童，除非医师或保健专家推荐使用。
- 不恰当的管饲方式可引起疾病，在准备和使用过程中应注意避免细菌污染。使用前应洗手。
- 在药物治疗前后用饮用水冲洗管饲管道可减少药物-营养物质不相容和管饲管堵塞的可能性。切忌用已被污染的水冲洗管道。

【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【儿童用药】

本品不能用于儿童。除非医师或保健专家推荐使用。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

GLO • DTP: EC
• DATE: 02 APR 2025 • FILE NAME: 130-072-006_Glucerna Vanilla_OUS-58_M525_500mL_Insert_v02.ai

PRESS STATIONS

PROCESS COLORS (CMYK)

BLACK

SPOT COLORS (PMS/GCMI)

AFFILIATE: OUS-58_China
COMMODITY: 130-072-006
GEN. SPEC. (US): X
CAD/DRAWING: DD ZWOL NSD BOOKLET 145x97MM-6 pages V2
SOURCE LABEL: 130-072-005

NOTE:

Abbott

PRINTER: ZWOL - NSD

Color reference: NA

After PDF approval
No color proof is needed

After approval
Please send print file to:
emea.gds@abbott.com

CORRECTLY DISPLAYED
IS NOT CORRECTLY DISPLAYED

If you see the text **IS NOT CORRECTLY DISPLAYED** inside the red dot, you need to set "Use Overprint Preview" to **Always** in the Acrobat settings.