

93 mm

95 mm

97 mm

145 mm

145 mm

【药理毒理】

本品含有低碳水化合物、高单不饱和脂肪酸,可供糖尿病患者补充人体日常生理功能所需的能量及营养成份。

【贮藏】

本品未开封时可在室温保存。本品在使用前须振摇混合均匀,一旦开封请即饮用。开封后加盖可在冰箱中保存24小时。放入管饲装置24小时后应抛弃。在准备和使用过程中须防止细菌污染。未开封的产品请在产品有效期内使用。

【包装】包装材料为RTH塑料瓶;包装规格:500ml/瓶。

【有效期】15个月。

【执行标准】JX20201024

【批准文号】国药准字HJ20160135

【上市许可持有人】

名称:ABBOTT LABORATORIES B.V.

注册地址:Rieteweg 21, 8041 AJ Zwolle, The Netherlands 荷兰

【生产企业】

企业名称:ABBOTT LABORATORIES B.V.

生产地址:Rieteweg 21, 8041 AJ Zwolle, The Netherlands 荷兰

【境内责任人】

名称:雅培贸易(上海)有限公司

地址:上海市自由贸易试验区美盛路56号4号楼109部位

联系方式:400-920-2660

标签号: 130-072-007  
List No.: M525  
©2026 Abbott

5

核准日期:2006 年 10 月 27 日  
修订日期:2007 年 07 月 11 日  
修订日期:2009 年 09 月 30 日  
修订日期:2011 年 03 月 23 日  
修订日期:2016 年 01 月 29 日  
修订日期:2019 年 01 月 17 日

修订日期:2020 年 10 月 14 日  
修订日期:2021 年 01 月 08 日  
修订日期:2023 年 12 月 26 日  
修订日期:2025 年 03 月 12 日  
修订日期:2026 年 07 月 31 日

**肠内营养混悬液 (TPF-D) 说明书**

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

**警示语:本品不能经肠外或静脉给药。**

【药品名称】

通用名称: 肠内营养混悬液 (TPF-D)  
商品名称: GLUCERNA® (伊力佳®)  
英文名称: Enteral Nutritional Suspension (TPF-D)  
汉语拼音: Changnei Yingyang Hunxuanye (TPF-D)

【成份】

本品为复方制剂,其组份为:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质。每100ml 本品含有以下营养素:

|                    |          |            |           |
|--------------------|----------|------------|-----------|
| 能量                 | 101 kcal | 烟酸         | 1.7 mg NE |
| 蛋白质                | 4.18 g   | 泛酸         | 0.75 mg   |
| 脂肪                 | 5.44 g   | 生物素        | 4.0 µg    |
| 碳水化合物              | 8.14 g   | 胆碱         | 42 mg     |
| 总膳食纤维              | 1.44 g   | <b>矿物质</b> |           |
| 水                  | 84.9 g   | 钠          | 93 mg     |
| 肉碱                 | 7.8 mg   | 钾          | 130 mg    |
| 牛磺酸                | 11 mg    | 氯          | 125 mg    |
| 肌醇                 | 84 mg    | 钙          | 70 mg     |
| <b>维生素</b>         |          | 磷          | 65 mg     |
| 维生素A*              | 546 IU   | 镁          | 20 mg     |
| 维生素D <sub>3</sub>  | 28 IU    | 铁          | 1.3 mg    |
| 维生素E               | 3.2 IU   | 锌          | 1.2 mg    |
| 维生素K <sub>1</sub>  | 5.6 µg   | 锰          | 0.35 mg   |
| 维生素C               | 11 mg    | 铜          | 0.14 mg   |
| 叶酸                 | 42 µg    | 碘          | 11 µg     |
| 维生素B <sub>1</sub>  | 0.16 mg  | 硒          | 4.9 µg    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | 0.18 mg  | 铬          | 7.0 µg    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | 0.21 mg  | 钼          | 10 µg     |
| 维生素B <sub>12</sub> | 0.30 µg  |            |           |

\* 每100ml中所含β-胡萝卜素相当于维生素A 280 IU。

6

1

97 mm

95 mm

93 mm

【性状】

本品为浅棕黄色不透明混悬液,具牛奶香草样气味。

【适应症】

本品是含有膳食纤维的特殊全营养液体制剂,主要适用于糖尿病患者。

【规格】500ml (1.01kcal/ml)

【用法用量】

本品可提供全面的、均衡的营养,并可长期作为营养支持的唯一来源。1升本品可提供1010kcal的热量。本品可以管饲也可以口服。

**管饲注意事项**

要遵医嘱进行。

管饲的方法和输入进度是基于以下几点考虑的:

- 对每个患者热量和营养素的需求的评估;
- 管饲的位置;
- 患者的体格条件;
- 应用抗高血糖药物和/或胰岛素的剂量和用药方法及时间

选择合适的管饲方法可以帮助确保患者耐受该配方,满足患者对热量和营养素的需 求,以控制好血糖。不论使用何种管饲方法,胰岛素和/或口服降血糖药物的剂量和使用方法须随管饲方法的改变而调整。

应该紧密地监视管饲的高血糖患者,特别是血糖的控制,其液体和电解质的状态。管饲的输入和/或药物的用法用量要根据需要随之调整。

**管饲的方法**

**间断管饲**

这种方法是通过缓慢的重力作用滴下或肠内管饲泵来传输营养素。一次处方的量(通常250到500mL)通常输入的时间为20到40分,一天5到8次。采用重力法管饲时,应使用10F或更大的管饲设备。选用管饲泵要优于重力法管饲,因为可能会有胃肠道不耐受的 症状的发生,特别是在管饲速度快或管饲容量大时。间断管饲或许有更好的优越性,因为它更像正常饮食的形式。

2

**持续管饲**

这种方法是通过长期的连续滴入的方式来传输营养素,一般是持续16到24小时。通常的,一个肠内管饲泵维持一个固定的输入速度。

开始管饲时,管饲速率和管饲量取决于患者的身体状况和耐受性。如果没有不良反 应发生,管饲速率和数量可逐渐增加直至摄入所需能量。管饲容量、速率、强度在管饲过程中须根据患者的营养需要和耐受性进行相应调整。一般建议在第一个8小时的起始速度为25-30mL/hr,可以在随后的8小时增加速度,直到在24-48小时内达到目的。

持续管饲是糖尿病患者较好的选择,因为持续超过24小时给予营养素可能会改善血糖控制并降低胰岛素需要量。

**对应用管饲进行营养支持的患者的观察**

**血糖**

许多糖尿病患者,特别是应用胰岛素或降血糖药物的患者要定期的检测血糖水平。也要对通过管饲进行肠内营养支持的患者检测,尽管他们不能自己测。开始管饲前,和管饲期间要定期确认血糖水平。

**液体和电解质的状态**

液体失衡会导致代谢紊乱。通常的,液体的摄入与排出相当,包括从肺部和皮肤的流失(通常每天为800mL)。评估身体水分的状态对糖耐量异常的患者来说是很重要的。很明显,脱水与糖尿病病情恶化或失控有关。一些管饲患者,由于其自身的条件,限制液体的摄入是很有必要的。因为这些患者对水的要求是不断变化的,同一个患者随着时间的变化定时评估其液体和电解质状态是需要的。

**口服**

热量需要依个体需要不同而异,因此需按医嘱使用。

**【不良反应】**

使用本品可能引起胃肠道不耐受,包括恶心、呕吐、腹痛、腹胀、腹泻、便秘、肠胃气胀和腹部不适等。此外还包括过敏症状,例如皮疹、瘙痒。

**【禁忌】**

本品与其他医用营养品一样,当口服或肠内营养不推荐使用时禁用。这些情况可能包括肠衰竭、肠梗阻、高流量肠痿、严重的短肠综合征或难治性腹泻,但并不仅限于此。

3

本品也禁用于已知对本品任一成份(如牛奶或大豆蛋白质)过敏的患者,禁用于对本品任一成份有先天性代谢障碍的患者(如半乳糖血症患者)。

**【注意事项】**

- 本品不能用于肠外和静脉注射。
- 本品应该在医师监督下管饲。
- 本品不能用于儿童,除非医师或保健专家推荐使用。
- 不恰当的管饲方式可引起疾病,在准备和使用过程中应注意避免细菌污染。使用前应洗手。
- 管饲系统是为单个患者使用而设计的,根据使用情况,必要时进行更换。在药物治疗前后用饮用水冲洗管饲管道可减少药物-营养物质不相容和管饲管堵塞的可能性。切忌用已被污染的水冲洗管道。
- 严重肾功能不全的患者慎用。
- 本品含有膳食纤维,不适用于要求低渣膳食的患者。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**未进行该项实验且无可靠参考文献。

**【儿童用药】**

本品不能用于儿童。除非医师或保健专家推荐使用。

**【老年用药】**未见老年人对本品的反应与年轻人群不同。

**【药物相互作用】**

对于使用管饲的患者,用药前后用水冲洗管饲管可减少药物-营养物相互作用和堵管的可能。本品包含维生素K,对使用香豆素类抗凝剂的患者应注意药物相互作用。

**【药物过量】**

给药过量时可能会出现恶心、呕吐或腹泻等胃肠道不良反应。

**【临床药理】**

**药代动力学**

本品为复方制剂,其组份为蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质,在体内消化吸收过程同正常食物。

4

Global Labeling Operations

• FILE NAME

130-072-007\_Glucerna Vanilla\_OUS-58\_M525\_500ml\_Insert\_

Version 4

• DATE

• PREPARED BY

• COMM.NR.

• AFFILIATE

• GEN.SPEC. (US)

25/08/2026

Wee Fong Emily Chun

130-072-007

OUS-58\_CHN

...

• CAD/DRAWING

DD ZWOL NSD BOOKLET 145x107MM-4 pages V2

• LIST NR(S).

• COLOR REFERENCE

• COLOR PROOF NEEDED

M525

130-072-006

No

• USED COLORS

Process Magenta



Process Black



Available for text



• ADDITIONAL INFORMATION

Templates contain approximate dielines unless otherwise specified. Always refer to and use the proper label drawing when creating production lables from templates. Production labels are to follow print vendor specifications.

Questions about template inputs (branding and claims) should be directed to the appropriate functional area responsible for providing and approving the inputs for this template (e.g., Regional Marketing, Nutrition Science, and Regulatory Affairs).

Templates PDFs are created at 100% scale. Overprint preview must be enabled in Acrobat to properly view the PDF.

Colors on printouts from desktop printers are for visual reference only and are not suitable for color matching. Please use only color proofs for color matching. No additional spot colors allowed.