

107 mm

【贮藏】

未开启时应干燥的地方贮存，避免过热，避免光照。开启后可在冰箱中保存48小时。放入管饲装置24小时后应抛弃。

【包装】

RTH 塑料瓶，500ml/瓶，1000ml/瓶。

【有效期】

15个月

【执行标准】

JX20201023

【批准文号】

国药准字 HJ20150255

【上市许可持有人】

名称：ABBOTT LABORATORIES B.V.
注册地址：Rieteweg 21, 8041 AJ, Zwolle, The Netherlands 荷兰

【生产企业】

企业名称：ABBOTT LABORATORIES B.V.
生产地址：Rieteweg 21, 8041 AJ, Zwolle, The Netherlands 荷兰

【境内责任人】

名称：雅培贸易(上海)有限公司
地址：上海市自由贸易试验区美盛路56号4号楼109部位
联系方式：400-920-2660

标签号: 130-073-006
List number: M355
©2026 Abbott

107 mm

核准日期:2006 年 10 月 27 日
修改日期:2008 年 04 月 17 日
修改日期:2010 年 07 月 29 日
修改日期:2012 年 05 月 11 日
修改日期:2015 年 05 月 05 日
修改日期:2019 年 01 月 22 日

修改日期:2020 年 10 月 14 日
修改日期:2021 年 01 月 08 日
修改日期:2023 年 10 月 30 日
修改日期:2025 年 03 月 12 日
修改日期:2026 年 07 月 31 日

肠内营养混悬液 (TPF-FOS) 说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语:本品不能经肠外或静脉给药。

【药品名称】

通用名称: 肠内营养混悬液 (TPF-FOS)
商品名称: JEVITY® (佳维体®)
英文名称: Enteral Nutritional Suspension(TPF-FOS)
汉语拼音: Changnei Yingyang Hunxuanye (TPF-FOS)

【成份】

本品为复方制剂,其组份为:水、麦芽糊精、酪蛋白、植物油、膳食纤维、矿物质和维生素等人体必需的营养素。每100ml中含:

	每100ml		每100ml
能量	107kcal	烟酸	1.8mg NE
蛋白质	4.00g	泛酸	0.93mg
脂肪	3.47g	生物素	5.0µg
碳水化合物	14.05g	胆碱	46mg
总膳食纤维	1.76g	矿物质	
(含低聚果糖	0.70g)	钠	93mg
水	83.3 g	钾	157mg
牛磺酸	10mg	氯	131mg
L-肉碱	8.4mg	钙	92mg
维生素		磷	72mg
维生素A*	377IU	镁	22mg
维生素D ₃	0.75µg	铁	1.4mg
维生素E	2.3mg α-TE	锌	1.1mg
维生素K ₁	6.2µg	锰	0.35mg
维生素C	10mg	铜	0.15mg
叶酸	27µg	碘	13µg
维生素B ₁	0.17mg	硒	5.3µg
维生素B ₂	0.20mg	铬	6.8µg
维生素B ₆	0.23mg	钼	11µg
维生素B ₁₂	0.39µg	氟	0.13mg

 | || * 每100ml中所含β-胡萝卜素相当于维生素A 310 IU。 | | | |

145 mm

107 mm

【性状】

本品为淡黄色不透明混悬液。

【适应症】

本品适用于成人,对低残留营养制剂不耐受的患者。
本品适用于营养不良或有营养不良可能的患者。
本品适用于需要管饲液体营养制剂的患者。本品可作为长期或短期管饲的全营养支持。
本品适用于需要低甜味营养制剂的患者,可口服给予。

【规格】

1.07 kcal/ml

【用法用量】

一般情况

本品作为肠内营养制剂必须在医生监护下使用。本品可作为唯一营养来源或营养素补充来源。
在打开之前,将本品反转和轻轻振摇几次,使沉淀物再分散(再分散运输和贮藏期间沉淀的成分)。
打开容器时,应无菌操作,避免细菌污染。

液体需求

为保证患者足够的液体摄入,在管饲期间可用水冲洗管饲管以补充额外水分,也可在给药前后给予额外水分。

口服给予

口服给予时,本品可室温给予或冷藏后给予。

管饲给予

遵医嘱进行。按照患者的情况和耐受性调整流速和流量。
安装管饲系统时、打开产品容器时、及更换管饲系统时应进行无菌操作。准备及使用时应注意避免污染。
由于配方中含有纤维素,当本品进行重力管饲时,推荐使用尺寸为10 French (管内径和管壁厚度的比值)或更粗的管子。由于低温会增加本品的粘度,冷藏的本品不容易通过管饲管。因此,本品只能在室温条件下进行管饲。不能重力管饲500ml以上的本品超过30分钟。
当管饲尺寸为8 French (管内径和管壁厚度的比值)或更小时,推荐使用管饲泵。每3~4个小时用20-50ml水冲洗管饲管,避免管饲管堵塞。
按照患者的情况和耐受性调整流速和流量。本品开始管饲时应以低速进行。如果没有不良反应或胃肠不耐受发生,管饲速度可逐渐增加,管饲可进行24-48小时或直到获得需要量的卡路里。
应监测水分和电解质状态,需要时可增加额外的液体。
本品的用量应根据患者的需要,由医生处方而定。

【不良反应】

使用本品可能引起胃肠道不耐受,包括恶心、呕吐、腹痛或腹部不适、腹胀、腹泻、胃肠气胀和消化不良等。还有罕见的过敏症状的报告。管饲开始时应低速进行,适应/耐受后再增加速度。

107 mm

【禁忌】

本品与其他医用营养品一样,当口服或肠内营养不推荐使用时禁用。这些情况可能包括肠衰竭、肠梗阻、高流量肠痿、严重的短肠综合征或难治性腹泻,但并不仅限于此。
本品也禁用于已知对本品任一成份(如牛奶蛋白)过敏的患者,禁用于对本品任一成份有先天性代谢障碍的患者(如半乳糖血症患者)。

【注意事项】

- 警告: 本品不适用于肠外或静脉内使用。
- 使用期间应避免细菌污染。使用前应洗手。
- 管饲系统是单个患者使用而设计的。为避免细菌污染,应至少24小时更换一次。
- 用药前后用水冲洗管饲管可减少药物-营养物不相容及管阻塞的可能。
- 严重糖代谢异常的患者慎用。
- 严重肝肾功能不全的患者慎用。
- 本品含有膳食纤维,不适用于需要低渣膳食的患者。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品为营养支持用药,是否使用可由医生处方决定。

【儿童用药】

本品不能用于儿童。

【老年用药】

未进行该项试验。或遵医嘱使用。

【药物相互作用】

对于使用管饲的患者,用药前后用水冲洗管饲管可减少药物-营养物相互作用和堵管的可能。本品包含维生素K,使用香豆素类抗凝剂的患者应注意药物相互作用。

【药物过量】

给药过量时可能会出现恶心、呕吐或腹泻等胃肠道不良反应。

【临床药理】

作用机制

详见【药理毒理】项下相关内容。

药代动力学

本品为复方制剂,其组份为水、麦芽糊精、酪蛋白、植物油、膳食纤维、矿物质和维生素等人体必需的营养素;本品在体内吸收代谢过程类似正常食物。

【药理毒理】

本品是等渗且强化纤维素的营养制剂,可为需要长期或短期管饲的患者提供全面均衡的营养支持。

145 mm

Global Labeling Operations

• FILE NAME				
130-073-006_Jevity_OUS-58_M355_500mL_Insert_ Version 5				
• DATE	• PREPARED BY	• COMM.NR.	• AFFILIATE	• GEN.SPEC. (US)
25/08/2026	Wee Fong Emily Chun	130-073-005	OUS-58_CHN	...
• CAD/DRAWING				
DD ZWOL NSD BOOKLET 145x107MM-4 pages V2				
• LIST NR(S).		• COLOR REFERENCE	• COLOR PROOF NEEDED	
M355		130-073-005	No	

• USED COLORS

Process Black

Available for text

stans

Cut

• ADDITIONAL INFORMATION

Templates contain approximate dielines unless otherwise specified. Always refer to and use the proper label drawing when creating production lables from templates. Production labels are to follow print vendor specifications.

Questions about template inputs (branding and claims) should be directed to the appropriate functional area responsible for providing and approving the inputs for this template (e.g., Regional Marketing, Nutrition Science, and Regulatory Affairs).

Templates PDFs are created at 100% scale. Overprint preview must be enabled in Acrobat to properly view the PDF.

Colors on printouts from desktop printers are for visual reference only and are not suitable for color matching. Please use only color proofs for color matching. No additional spot colors allowed.